

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาไข้เลือดออก (1)

การตรวจเพื่อคัดกรองผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นไข้เลือดออกที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก

ไข้สูง $> 38.5^{\circ}\text{C}$
ไม่มีอาการเฉพาะ

ซักประวัติและตรวจร่างกาย : ปวดท้องมาก
อาเจียนมาก เลือดออก มีภาวะขาดน้ำ ช็อก
(pulse pressure แคบ เช่น 100/80 มม.ปรอท
ความดันต่ำ ชีพจรเบาเร็ว ตัวเย็น เหงื่อออก ระบบ
ไหลเวียนโลหิตปลายมือปลายเท้าไม่ดี
capillary refill > 2 วินาที

มี

เจาะ CBC * และรับไว้สังเกต
อาการในโรงพยาบาล พร้อม
ทั้งให้การรักษาเบื้องต้นตาม
อาการของผู้ป่วย


ไม่มี

ให้การรักษาเบื้องต้น เจาะ CBC *
ถ้ามีไข้สูง > 48 ชม.

- ⇒ นัดตรวจติดตามทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 3 ของโรคเป็นต้นไป (แล้วแต่อาการ)
- ⇒ แนะนำอาการที่ต้องนำผู้ป่วยมาโรงพยาบาลทันที
 - มีอาการเลวลงเมื่อไข้ลงหรือไข้ลงแล้วยังเพลีย
 - เลือดออกผิดปกติ
 - อาเจียนมาก
 - ปวดท้องมาก
 - ซึม ไม่ดื่มน้ำ บางรายอาจกระหายน้ำมาก
 - มีอาการช็อก : กระสับกระส่าย, ะอะอะ โวยวาย, ร้องกวนมากในเด็กเล็ก
 - ความประพฤติเปลี่ยนแปลง เช่น พูดไม่รู้เรื่อง
 - เพ้อ, ตัวเย็น, เหงื่อออก
 - ไล่สวามีน้อยลง

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาไข้เลือดออก (2)


การให้ IV fluid ในระยะไข้ ในผู้ป่วยที่มีอาการขาดน้ำปานกลางถึงมาก หรือในผู้ป่วยที่มีอาเจียนมาก



* ถ้าตรวจพบว่าผู้ป่วยมี WBC ประมาณ 5,000 เซล/ลบ.มม. หรือต่ำกว่า ร่วมกับมี relatively lymphocytosis และมี Platelet ประมาณ 100,000 -120,000 เซล/ลบ.มม. ควรให้ 5%D/NSS หรือเนื่องจากผู้ป่วยกำลังจะเข้าสู่ระยะวิกฤต

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาไข้เลือดออก (3)


การให้สารน้ำในการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี (น้ำหนัก 15 – 40 กก.) ที่กำลังอยู่ในระยะวิกฤต



- หมายเหตุ**
- ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 15 กก. ให้เริ่ม IV fluid rate 2 ซีซี/กก./ชม.
 - ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักเกิน 40 กก. ให้เริ่ม IV fluid rate 1 ซีซี/กก./ชม.
 - * Blood Component : เช่น PRC, L-PRC or FWB ถ้ามี

แนวทางการวินิจฉัยและรักษาไข้เลือดออก (4)

การให้สารน้ำในการรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกเดงกี (น้ำหนัก 15 – 40 กก.) ที่มีภาวะช็อกรุนแรง



หมายเหตุ

- * การตรวจทางห้องปฏิบัติการถ้าไม่สามารถตรวจได้ พิจารณาให้ Vitamin K. Ca. NaHCO₃ ตามอาการทางคลินิก
- ** ตรวจเช็คผลทางห้องปฏิบัติการตาม * และแก้ไขโดยด่วนถ้าผิดปกติ
- 5% DLR หมายถึง 5% Dextrose Lactate Ringer - 5% DAR หมายถึง 5% Dextrose Acetate Ringer (Acetar)